

ISOMATE OFM ROSSO

per il controllo di
CYDIA MOLESTA (tignola orientale del pesco)
e **CYDIA FUNEBRANA** (tignola delle susine)



CARATTERISTICHE

Isomate OFM rosso è un diffusore a rilascio controllato del feromone sintetico chimicamente analogo a quello naturale di *Cydia molesta* costituito da due tubi paralleli di materiale polimerico di cui uno contenente il filo di alluminio che ne permette l'applicazione e l'altro riempito del feromone specifico.

APPLICAZIONE

Applicare il prodotto **PRIMA** delle primissime catture della generazione svernante. Attorcigliare in modo lasco i diffusori sulle parti legnose della pianta evitando l'esposizione diretta al sole. Non stringere eccessivamente per evitare la rottura del diffusore.

MONITORAGGIO

L'applicazione del metodo della confusione sessuale necessita di frequenti controlli di campo per mantenere sotto controllo l'evoluzione della popolazione del fitofago e intervenire tempestivamente per abbassare le popolazioni qualora necessario.

Posizionare le trappole di monitoraggio all'interno del frutteto e lungo i bordi delle aree in confusione e ispezionarle settimanalmente. Normalmente si ha un azzeramento quasi totale delle catture.

I controlli in prima generazione sono molto importanti per determinare l'eventuale necessità di un trattamento chimico integrativo. Nel pesco controllare almeno 500 getti su 10 piante (circa 50 getti/pianta) sia al centro che lungo i bordi dell'appezzamento alla fine dello sviluppo larvale di prima generazione.

Considerare la possibilità di effettuare un intervento insetticida di supporto quando il grado di attacco sui getti si attesta sul 2-3%.

Nel melo controllare 500 getti oppure 500 frutti sia al centro che lungo i bordi dell'appezzamento. Considerare la possibilità di effettuare un intervento insetticida di supporto quando il grado di attacco sui getti si attesta sul 5% nei getti e sullo 0,5% nei frutti.



pesco



susino



melo



pero

ISOMATE OFM ROSSO



COLTURA

Pesco, Susino, Melo, Pero

INSETTO BERSAGLIO

Tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*)
Tignola delle susine (*Cydia funebrana*)

DOSAGGIO

600 diffusori/ha più il rinforzo sui bordi

CONSERVAZIONE

Nell'imballo originale ed a temperatura non superiore a 5 °C il prodotto si conserva per 2 anni. Nel caso di **conservazione in frigorifero** per la stagione successiva, mantenere il materiale a temperatura ambiente per almeno un mese prima dell'applicazione in campo.

COMPOSIZIONE

(Z)-8-Dodecenyl acetate, (E)-8-Dodecenyl acetate
(Z)-8-Dodecen-1-ol

CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA

Xi, R38 irritante per la pelle

NUMERO/DATA REG.

N° 11549 del 20/01/2003

CONFEZIONE

Pacco da 100 diffusori
Pacco da 400 diffusori
Cartone da 5600 diffusori

